

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

EDITION DE LA STATION POITOU - CHARENTES
CHARENTE - CHARENTE-MARITIME - DEUX-SEVRES - VIENNE
SERVICE DE LA PROTECTION DES VEGETAUX
ROUTE DE VASLES - BIARD - 86000 POITIERS - TEL. (49) 88.35.55

ABONNEMENT ANNUEL 50 F.

C. C. P. LIMOGES 4. 752. 22. W.
Sous Régisseur de recettes et d'avances
AVERTISSEMENTS AGRICOLES
Rte de Vasles - Biard - 86000 POITIERS

BULLETIN N° 37 - JUIN 1975 (Suite)

CAMPAGNOLS

SITUATION

Les sondages récents indiquent une évolution de la situation conforme aux prévisions communiquées début Mars, à savoir :

Populations jeunes (60 à 80 % des animaux de moins de 45 jours) et reproduction élevée chez les femelles (de 80 à 100 %).

Cet état de choses laisse prévoir un danger de pullulation et des risques de dégâts sur céréales, dès la première coupe de foin.

Dans les régions intéressées où les traitements préventifs recommandés ont sans doute été insuffisamment généralisés, intervenir immédiatement pour éviter la pénétration dans les céréales sitôt la première coupe. En effet privés brusquement de couvert et de nourriture après la fauche, les campagnols émigrent massivement vers les céréales voisines.

TRAITEMENTS et DOSES

Pour éviter l'envahissement des céréales épandre autour du champ ou au moins en bordure de toute prairie limitrophe une ou plusieurs traînées de grains traités au chloro-phacinone.

- Une à trois lignes distantes de 3 m. seront suffisantes pour constituer une barrière de sécurité.
- En cas d'envahissement total traiter le champ en entier en lignes distantes de 5 m.
- Dans tous les cas la dose d'épandage sera de 10 à 12,5 gr. au mètre linéaire soit 20 à 25 Kg Ha en traitement total.

Pour exécuter le traitement :

- Répandre les grains à la main (protégée par un gant) ou mieux à l'aide d'un récipient verseur (boîte perforée, arrosoir...). Opération relativement facile et rapide : Avec un arrosoir un hectare peut être traité en $\frac{1}{2}$ heure.

NOTES * Ne jamais épandre le grain à la volée (méthode pratiquement inefficace) ni en tas, méthode qui présente un risque pour le gibier à poil.

- * Ne pas oublier de traiter les prairies, après coupe, dans le but d'éviter des dégâts lors de la nouvelle pousse. En traitement total une dose de 10 à 15 Kg ha sera suffisante.


En traitement complémentaire il sera bon de placer de petits tas de grains sous les bottes de foin, avant leur enlèvement.

Département des Deux-Sèvres

Pour tous renseignements d'organisation de lutte collective, consulter votre Groupement de Défense local, ou à défaut, adressez-vous à la Fédération départementale des Groupements de Défense, 68 rue Alsace Lorraine 79027 NIORT CEDEX Tél. 24-09-55.

DISPOSITION DES APPATS

pour REDUIRE la CONTAMINATION d'une CEREALE à PARTIR des
BERMES et PRES VOISINS



*** Traînées continues d'appâts à 10 - 12,5 g/m²
(3 mètres entre les traînées)